

LSV Sommergerste in später Herbstaussaat 2025 Löß-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

18.07.2025

Intensität	Sorte	Typ	2023 n = 5 / 5	2024 n = 2 / 2	Versuchsjahr 2025	
					Nossen	Pommritz
Stufe I	Leandra (B)	zz	80,1	80,7	83,6	84,3
	Amidala (B)	zz	78,1	72,3	81,4	80,8
	Lexy (B)	zz	76,1	72,7	81,6	88,8
	LG Caruso	zz		88,6	85,2	83,3
	Ostara	zz			75,4	78,4
	Mittel				81,4	83,1
	Mittel (B)		78,1	75,2	82,2	84,6
	GD 5 %				3,8	8,5
Stufe II	Leandra (B)	zz	83,7	88,0	90,1	97,3
	Amidala (B)	zz	82,6	88,5	86,0	103,0
	Lexy (B)	zz	82,8	87,9	92,9	100,3
	LG Caruso	zz		98,5	91,3	109,2
	Ostara	zz			79,9	101,5
	Mittel				88,0	102,2
	Mittel (B)		83,0	88,1	89,7	100,2
	GD 5 %				3,8	8,5

B = Sorten der Bezugsbasis

n = Orte Stufe I / Orte Stufe II

LSV Sommergerste in später Herbstaussaat 2025 Löß-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	Typ	2023 n = 5 / 5	2024 n = 2 / 2	Versuchsjahr 2025	
					Nossen	Pommritz
Stufe I	Leandra (B)	zz	103	107	102	100
	Amidala (B)	zz	100	96	99	95
	Lexy (B)	zz	97	97	99	105
	LG Caruso	zz		118	104	98
	Ostara	zz			92	93
	Mittel (B)		78,1	75,2	82,2	84,6
	GD 5 %				4,6	10,0
Stufe II	Leandra (B)	zz	101	100	101	97
	Amidala (B)	zz	99	100	96	103
	Lexy (B)	zz	100	100	104	100
	LG Caruso	zz		112	102	109
	Ostara	zz			89	101
	Mittel (B)		83,0	88,1	89,7	100,2
	GD 5 %				4,2	8,4

B = Sorten der Bezugsbasis

n = Orte Stufe I / Orte Stufe II