

LSV Sommergerste in später Herbstsaat 2026 Löß-Standorte (SN + TH)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

21.07.2026

Intensität	Sorte	Typ	2024 n = 2 / 2	2025 n = 5 / 5	Versuchsjahr 2026			2026 n = 2 / 3
					Nossen	Pommritz	Dornburg (TLLLR)	
Stufe I	Leandra (B)	zz	80,7	91,8		99,3	73,4	86,4
	Lexy (B)	zz	72,7	93,9		103,2	73,7	88,4
	LG Caruso (B)	zz	88,6	97,2		93,3	75,4	84,3
	Excalibur	zz				99,4	81,9	90,6
	LG Baryton	zz				100,5	78,5	89,5
	Mittel					99,1	76,6	
	Mittel (B)		80,7	94,3		98,6	74,2	86,4
	GD 5 %					7,3	7,2	
Stufe II	Leandra (B)	zz	88,0	105,0	73,3	103,5	86,8	87,8
	Lexy (B)	zz	87,9	107,7	68,1	98,1	86,1	84,1
	LG Caruso (B)	zz	98,5	105,7	62,3	96,7	79,8	79,6
	Excalibur	zz			68,4	103,7	89,1	87,0
	LG Baryton	zz			68,8	101,0	83,8	84,5
	Mittel				68,2	100,6	85,1	
	Mittel (B)		91,5	106,1	67,9	99,4	84,2	83,8
	GD 5 %				8,6	7,3	7,2	

B = Sorten der Bezugsbasis

Nossen 2026: nur in Stufe II geführt (Auswinterungsschäden)

n = Orte Stufe I / Orte Stufe II

auswinterungsbedingt: 2024 nur 2 und 2026 nur 3 Versuche wertbar (5 Versuche angelegt)

LSV Sommergerste in später Herbstsaat 2026 Löß-Standorte (SN + TH)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	Typ	2024 n = 2 / 2	2025 n = 5 / 5	Versuchsjahr 2026			2026 n = 2 / 3
					Nossen	Pommritz	Dornburg (TLLLR)	
Stufe I	Leandra (B)	zz	100	97		101	99	100
	Lexy (B)	zz	90	100		105	99	102
	LG Caruso (B)	zz	110	103		95	102	98
	Excalibur	zz				101	110	105
	LG Baryton	zz				102	106	104
	Mittel (B)		80,7	94,3		98,6	74,2	86,4
	GD 5 %					7,4		
Stufe II	Leandra (B)	zz	96	99	108	104	103	105
	Lexy (B)	zz	96	101	100	99	102	100
	LG Caruso (B)	zz	108	100	92	97	95	95
	Excalibur	zz			101	104	106	104
	LG Baryton	zz			101	102	99	101
	Mittel (B)		91,5	106,1	67,9	99,4	84,2	83,8
	GD 5 %				12,7	7,3		

B = Sorten der Bezugsbasis

Nossen 2026: nur in Stufe II geführt (Auswinterungsschäden)

n = Orte Stufe I / Orte Stufe II

auswinterungsbedingt: 2024 nur 2 und 2026 nur 3 Versuche wertbar (5 Versuche angelegt)