

Wintertdinkel im ökologischen Anbau; Jahr: 2025**Kornertrag bei 86% TS dt/ha**

05.09.2025

Sorte	2023	2024	2025	Einzelorte 2025					24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel
Albertino(B)	56,7	46,2	66,6	67,1	72,1	69,2	79,4	45,0	54,7	55,4
Alboretto(B)	56,9	46,4	68,1	68,6	73,3	70,0	77,8	50,8	55,4	55,9
Badenglanz(B)	56,2	49,0	67,6	68,9	69,1	71,5	79,7	48,8	56,8	56,6
Gletscher(B)	53,1	46,7	65,7	60,3	72,8	70,9	74,5	49,8	54,6	54,1
Stauferpracht(B)	58,4	48,7	69,0	64,7	73,2	75,5	82,4	49,2	57,1	57,5
Zollernfit(B)	55,6	46,7	66,0	67,1	73,3	70,5	72,4	46,6	54,7	55,0
Zollernspelz(B)	54,2	46,2	64,0	63,1	70,1	69,0	71,4	46,3	53,6	53,8
Späths Albrubin		39,4	63,0	66,5	67,8	68,1	67,1	45,5	49,2	
Asturin		44,1	64,1	66,3	66,9	70,4	70,6	46,5	52,5	
Polkura	55,9			69,0	75,5		75,8			
Alliente			75,2	76,1	77,8	78,9	86,8	56,4		
Conforte			67,2	68,6	71,4	73,7	71,7	50,6		
Cascada				58,3	65,0		64,5			
Mittel (B)	55,9	47,2	66,7	65,7	72,0	70,9	76,8	48,1	55,3	55,5
GD 5 %				2,8	3,4	3,2	4,8	5,7		

Kornertrag relativ

Sorte	2023	2024	2025	Einzelorte 2025					24/25	23-25
	Mittel	Mittel	Mittel	Bernburg	Burkersdorf	Forchheim	Mittelsömmern	Nossen Öko	Mittel	Mittel
Albertino(B)	101	98	100	102	100	98	103	94	99	100
Alboretto(B)	102	98	102	104	102	99	101	106	100	101
Badenglanz(B)	100	104	101	105	96	101	104	102	103	102
Gletscher(B)	95	99	98	92	101	100	97	104	99	98
Stauferpracht(B)	104	103	103	99	102	106	107	102	103	104
Zollernfit(B)	99	99	99	102	102	99	94	97	99	99
Zollernspelz(B)	97	98	96	96	97	97	93	96	97	97
Späths Albrubin		84	94	101	94	96	87	95	89	
Asturin		94	96	101	93	99	92	97	95	
Polkura	100			105	105		99			
Alliente			113	116	108	111	113	117		
Conforte			101	104	99	104	93	105		
Cascada				89	90		84			
Mittel (B)	55,9	47,2	66,7	65,7	72,0	70,9	76,8	48,1	55,3	55,5
GD 5 %				4,3	4,7	4,5	6,2	11,8		

(B) Bezugsbasis

Empfehlungssorten für die Aussaat 2025:Badenglanz, Stauferpracht, Zollernfit, Zollernspelz, Albertino^{**}, Alboretto^{**}

* = Lagergefahr auf besseren Standorten

** = stärkere Anfälligkeit für Gelb- und Braunrost