

## Ergebnisse der Landessortenversuche

**Kultur / Nutzungsrichtung:** Winterfuttergerste  
**Auswertungszeitraum:** 2021 - 2023  
**Anbaugebiet:** D-Süd-Standorte

**Beteiligte Einrichtungen:** Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern  
 Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg  
 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt  
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

### Empfehlungssorten zur Aussaat 2024:

	<b>D-Süd-Standorte</b>	<b>Löß-Standorte</b>	<b>V-Standorte</b>
<b>mz</b>	SU Jule, Esprit, Teuto, SU Midnight, Melia	Teuto, Esprit, KWS Higgins, SU Jule, Viola	Esprit, Teuto, SU Midnight
		vorläufig: Julia, SU Hetti, Avantasia Avantasia	vorläufig: SU Hetti, Julia
<b>(H) *)</b>	SY Baracooda (H) SY Galileo (H)	SY Dakoota (H) SY Galileo (H)	SY Dakoota (H) SY Galileo (H)
<b>zz **)</b>	Bordeaux		Bordeaux

mz ... mehrzeilige Sorten

zz ... zweizeilige Sorten

(H) Hybridsorten

\*) bei betrieblicher Entscheidung für Hybridgerste (H)

\*\*) bei betrieblicher Entscheidung für zweizeilige Sorten

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:  
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

LSV Winterfuttergerste 2021-2023 D-Süd-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2021	2022	2023									2022/23	2021-23
		Mittel	Mittel	Vipperow	Sonnenwalde	Kranepuhl	Lüchfeld	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel		
ohne Fungizid	SU Jule (B)	76,7	77,8		58,9	80,2			67,5	77,4	93,4	75,5	76,7	76,7
	SY Galileo (B)	77,0	77,2		51,8	79,0			64,2	74,5	98,5	73,6	75,4	75,8
	SY Baracooda (B)	71,1	76,9		51,9	70,1			69,3	77,5	84,7	70,7	73,8	73,0
	Melia (B)	75,8	75,0		57,8	77,1			67,4	68,7	92,3	72,6	73,8	74,4
	Esprit (B)	71,4	79,5		54,6	77,3			64,0	74,3	90,1	72,0	75,7	74,5
	Teuto (B)	75,8	79,3		52,7	81,8			70,5	66,2	103,4	74,9	77,1	76,7
	SU Midnight (B)	76,8	77,6		50,1	73,6			70,2	72,1	95,6	72,3	74,9	75,5
	Picasso	76,3	76,3		58,3	71,0			60,2	67,8	88,9	69,2	72,8	73,8
	Winnie		80,7		59,3	76,1			73,0	73,4	93,1	75,0	77,8	
	Julia		78,4		61,4	87,6			74,3	72,2	96,3	78,4	78,4	
	SU Hetti		79,2		65,0	83,4			76,9	72,0	88,6	77,2	78,2	
	RGT Mela		78,4		65,3	73,2			70,6	75,0	92,7	75,3	76,9	
	Avantasia				58,6	80,2			69,4	74,3	93,7	75,2		
	Integral				66,0	77,6			67,3	72,8	92,3	75,2		
	Nimbus				63,4				58,8	71,7	97,9			
	SU Verena				62,0				65,9	76,1	95,9			
	SU Virtuosa				57,9	79,0			50,1	81,4	91,0	71,9		
	SY Loona				60,1	76,0			68,7	77,5	92,5	74,9		
	KWS Exquis		76,0		54,3	78,8			62,8	82,2	93,0	74,2	75,1	
	KWS Faro													
	Bordeaux (B)	70,4	77,3		67,5	74,3			64,8	78,3	87,1	74,4	75,8	74,3
	KWS Tardis				61,2	76,1			69,4	75,3	85,6	73,5		
	Aros				67,6	78,9			68,5	74,5	88,2	75,5		
	Goldmarie				64,3	83,9			67,7	81,6	96,3	78,8		
<b>Mittel</b>	71,6	77,6		58,8	77,9			67,0	74,6	92,6	74,3	75,9	75,0	
<b>Mittel (B)</b>	74,4	77,6		55,6	76,7			67,2	73,6	93,1	73,2	75,4	75,1	
<b>Grenzdifff</b>				3,8	4,1			12,1	14,7	8,1				
mit Fungizid	SU Jule (B)	82,2	85,0	76,5	59,7	79,5	76,9	84,4	72,4	73,4	95,9	77,3	80,9	81,3
	SY Galileo (B)	82,6	83,2	75,8	57,0	79,9	85,4	82,1	76,5	78,2	105,6	80,1	81,5	81,9
	SY Baracooda (B)	81,1	86,7	70,4	56,2	77,5	78,0	81,7	83,5	76,5	96,7	77,6	81,8	81,6
	Melia (B)	82,6	83,6	80,2	55,9	79,8	79,1	78,5	74,6	79,8	94,9	77,9	80,5	81,2
	Esprit (B)	79,8	86,3	71,2	53,7	80,0	84,3	80,0	76,1	80,5	103,0	78,6	82,2	81,4
	Teuto (B)	81,4	82,8	81,2	56,5	82,2	80,1	85,0	83,1	68,0	109,2	80,7	81,7	81,6
	SU Midnight (B)	86,0	83,6	90,4	42,1	79,9	80,9	75,6	75,8	78,9	107,5	78,9	81,1	82,7
	Picasso		82,4	82,6	45,0	75,3	77,9	75,1	75,0	79,2	101,6	76,5	79,2	
	Winnie		83,8	81,2	57,4	77,1	81,0	76,9	81,6	74,0	108,1	79,7	81,6	
	Julia		83,0	87,9	54,2	87,7	78,5	78,2	82,2	72,5	102,7	80,5	81,6	
	SU Hetti		82,7	87,6	54,0	85,6	76,7	83,3	82,9	74,4	104,6	81,1	81,9	
	RGT Mela		84,6	81,4	62,0	84,4	84,4	74,2	80,2	73,6	99,5	80,0	82,1	
	Avantasia			82,4	50,8	82,8	83,4	72,6	77,8	69,3	109,1	78,5		
	Integral			77,8	64,8	86,8	77,9	81,7	79,1	78,8	108,9	82,0		
	Nimbus			77,7	51,4				83,2	72,4	106,5			
	SU Verena			74,6	50,0				78,1	82,5	76,9	112,1		
	SU Virtuosa			78,7	53,5	79,7	83,4	80,9	73,3	78,5	100,5	78,6		
	SY Loona			86,9	66,6	85,1	77,5	75,8	71,7	68,7	103,3	79,4		
	KWS Exquis		80,3	84,7	65,6	82,5	77,1	77,3	82,7	74,4	110,2	81,8	81,1	
	KWS Faro			72,4										
	Bordeaux (B)	77,2	83,4	80,8	68,4	80,9	79,8	83,6	78,9	74,6	103,4	81,3	82,3	80,7
	KWS Tardis			78,4	69,5	80,3	70,0	86,5	69,4	71,5	101,1	78,3		
	Aros			82,3	62,0	80,5	74,2	78,4	71,5	73,4	93,7	77,0		
	Goldmarie			91,0	69,2	84,7	81,1	82,6	82,7	76,4	106,7	84,3		
<b>Mittelwert</b>	78,1	83,1	80,3	57,9	81,5	79,4	79,7	77,6	75,0	103,7	79,5	81,4	81,5	
<b>Mittel (B)</b>	81,6	84,3	78,3	56,2	80,0	80,6	81,4	77,6	76,2	102,0	79,0	81,5	81,5	
<b>Grenzdifff</b>			6,4	3,8	4,1	4,5	7,4	12,1	14,7	8,1				









































































LSV Winterfuttergerste 2021-2023 D-Süd-Standorte

Undefinierbare Blattflecken

Intensität	Sorte	2021	2022	2023									2022/23	2021-23
		Mittel	Mittel	Vipperow	Sonnenwalde	Kranepuhl	Lüchfeld	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel		
ohne Fungizid	SU Jule (B)	1,5	2,3							1,0		1,0	1,8	1,7
	SY Galileo (B)	2,0	2,3							1,0		1,0	1,8	1,9
	SY Baracooda (B)	1,5	2,5							1,5		1,5	2,2	1,9
	Melia (B)	1,3	2,5							1,0		1,0	2,0	1,7
	Esprit (B)	2,0	3,0							1,0		1,0	2,3	2,2
	Teuto (B)	1,8	3,0							1,0		1,0	2,3	2,1
	SU Midnight (B)	1,5	2,5							1,0		1,0	2,0	1,8
	Picasso	1,3	2,8							1,0		1,0	2,2	1,8
	Winnie		3,0							1,0		1,0	2,3	
	Julia		2,5							1,0		1,0	2,0	
	SU Hetti		2,8							1,5		1,5	2,3	
	RGT Mela		3,0							1,0		1,0	2,3	
	Avantasia									1,0		1,0		
	Integral									1,0		1,0		
	Nimbus									1,0		1,0		
	SU Verena									1,0		1,0		
	SU Virtuosa									1,5		1,5		
	SY Loona									1,5		1,5		
	KWS Exquis		2,3							1,0		1,0	1,8	
	KWS Faro													
	Bordeaux (B)	1,3	3,0							1,0		1,0	2,3	1,9
	KWS Tardis									1,0		1,0		
	Aros									1,5		1,5		
Goldmarie									1,0		1,0			
<b>Mittelwert</b>	1,5	2,6							1,1		1,1	2,1	1,9	
<b>Mittel (B)</b>	1,6	2,6							1,1		1,1	2,1	1,9	
<b>Grenzdifff</b>														
mit Fungizid	SU Jule (B)	1,0	2,3							1,0		1,0	1,8	1,4
	SY Galileo (B)	1,3	2,3							2,0		2,0	2,2	1,8
	SY Baracooda (B)	1,3	1,5							1,5		1,5	1,5	1,4
	Melia (B)	1,6	2,5							1,5		1,5	2,2	1,9
	Esprit (B)	2,1	2,5							1,5		1,5	2,2	2,1
	Teuto (B)	2,0	2,5							2,0		2,0	2,3	2,2
	SU Midnight (B)	1,0	2,0							1,5		1,5	1,8	1,4
	Picasso	1,3	2,5							1,0		1,0	2,0	1,7
	Winnie		2,8							1,0		1,0	2,2	
	Julia		3,0							1,5		1,5	2,5	
	SU Hetti		2,3							1,5		1,5	2,0	
	RGT Mela		2,5							2,0		2,0	2,3	
	Avantasia									2,0		2,0		
	Integral									2,0		2,0		
	Nimbus									2,0		2,0		
	SU Verena									1,5		1,5		
	SU Virtuosa									1,5		1,5		
	SY Loona									1,0		1,0		
	KWS Exquis		2,0							1,5		1,5	1,8	
	KWS Faro													
	Bordeaux (B)	1,4	1,5							1,5		1,5	1,5	1,5
	KWS Tardis									1,0		1,0		
	Aros									2,0		2,0		
Goldmarie									1,0		1,0			
<b>Mittelwert</b>	1,4	2,2							1,5		1,5	2,0	1,7	
<b>Mittel (B)</b>	1,5	2,1							1,6		1,6	1,9	1,7	
<b>Grenzdifff</b>														

### LSV Winterfuttergerste 2021 - 2023 D-Süd-Standorte

#### Allgemeine Angaben

Ort	Vorfrucht	Grundboden- bearbeitung	Datum der		Aussaat- stärke Körner/m <sup>2</sup>
			Aussaat	Ernte	
Vipperow	Weizen, Winter-		22.09.2022	11.07.2023	
Sonnenwalde	Raps, Winter- (Körnernutzung)	05.09.2022	24.09.2022	06.07.2023	
Kranepuhl	Raps, Winter- (Körnernutzung)		23.09.2022	11.07.2023	
Lüchfeld	Erbse, Futter- (Körnernutzung)	26.09.2022	29.09.2022	04.07.2023	
Beerfelde	Raps, Winter- (Körnernutzung)		26.09.2022	04.07.2023	
Gadegast	Körnerfuttererbsen (Grünnutzung)	15.09.2022	21.09.2022	06.07.2023	
Beetzendorf	Hafer (Körnernutzung)	16.09.2022	26.09.2022	10.07.2023	320
Baruth	Erbse	22.09.2022	23.09.2022	04.07.2023	250

#### Bodenuntersuchung

Ort	Datum	pH-Wert	in mg je 100 g Boden			in mg je 1000 g Boden				
			K <sub>2</sub> O	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Mg	B	Cu	S	Mn	Na
Vipperow										
Sonnenwalde	30.01.23	6,3	10,5	12,0	13,8					
Kranepuhl	15.02.23	6,3	17,6	7,8	8,0					
Lüchfeld										
Beerfelde	21.01.23	6,8	12,4	12,4	8,0					
Gadegast	28.07.22	6,7	13,0	15,6	11,9	0,3	5,5		17,0	0,7
Beetzendorf	23.08.22	6,1	15,7	9,9	5,4	0,4	2,8	0,7	46,0	2,3
Baruth	14.07.22	6,0	11,8	13,7	11,0					

#### N-min- und S-min-Untersuchung (in kg/ha)

Ort	Datum	N-min in kg/ha		
		0 - 30 cm	30 - 60 cm	60 - 90 cm
Vipperow				
Sonnenwalde	30.01.22	14	11	
Kranepuhl	15.02.23	13	9	
Lüchfeld				
Beerfelde	21.01.23	11	8	
Gadegast	14.02.23	4	5	6
Beetzendorf	07.02.23	6	5	5
Baruth	09.02.23	10	6	

**LSV Winterfuttergerste 2021 - 2023 D-Süd-Standorte**  
**Düngung Begleitmaßnahme**

Ort	Datum	BBCH	Mittel	N	P2O5	K2O	MgO	CaO	S
Vipperow	21.03.23		Kalkammonsalpeter	80	0	0	0		0
Vipperow	31.03.23		Alzon neo N	60					
Sonnenwalde	22.03.23	29	Klakmonsalpeter	81					
Sonnenwalde	12.04.23	31	Kalkammonsalpeter	41					
Kranepuhl	23.03.23	27	Kalkammonsalpeter	60					
Kranepuhl	02.05.23	39	Kalkammonsalpeter	70					
Lüchfeld	12.03.23	25	Hydrosulfan (24 N, 6 S)	60					
Lüchfeld	16.04.23		Kalkammonsalpeter	27					
Beerfelde	30.03.23	29	AHL	70					
Beerfelde	30.04.23	32	AHL	78					
Gadegast	28.02.23	22	NPK-Dünger	50	50	50			30
Gadegast	22.03.23	24	Ammoniumsulfatsalpeter	50					25
Gadegast	03.04.23	30	Kalkammonsalpeter	52					0
Beetzendorf	15.09.22	0	PK-Dünger	0	115	249	83	0	
Beetzendorf	03.03.23	23	NPK-Dünger	30	12	22	8	0	141
Beetzendorf	16.03.23	23	Kalkammonsalpeter 27	59					
Beetzendorf	21.03.23	29	Kieserit	0	0	0	39	0	31,5
Beetzendorf	14.04.23	31	Kalkammonsalpeter 27	50					
Baruth	18.07.22		PK-Dünger		46	60			
Baruth	20.03.23	25	Kalkammonsalpeter 27	75					
Baruth	19.04.23	31	Kalkammonsalpeter 27	60					

**LSV Winterfuttergerste 2021 - 2023 D-Süd-Standorte  
PSM-Begleitmaßnahmen**

Ort	Datum	BBCH	Mittel	Menge	Wirkungsbereich
Vipperow	17.04.23		POINTER Plus	0,05 kg/ha	H
Vipperow	17.04.23		AXIAL 50	0,9 l/ha	H
Sonnenwalde	03.11.22	13	Karate Zeon	0,075 l/ha	I
Sonnenwalde	03.11.22	13	Sunfire	0,25 l/ha	H
Sonnenwalde	03.11.22	13	Viper Compact	0,75 l/ha	H
Kranepuhl	20.10.22	13	Trimmer WG	0,015	H
Kranepuhl	20.10.22	13	Karate Zeon	0,075	I
Kranepuhl	20.10.22	13	Broadcast	0,3	H
Kranepuhl	11.04.23	31	Axial 50	1	H
Kranepuhl	24.05.23	69	Nexide	0,08	I
Lüchfeld	11.10.22	10	Battle Delta	0,4	H
Lüchfeld	27.10.22	12	Trimmer WG	0,02	H
Lüchfeld	27.10.22	12	Karate Zeon	0,075	I
Lüchfeld	16.04.23		Moddus	0,4	W
Lüchfeld	16.04.23		Tebucur 250 W	0,6	F
Lüchfeld	16.04.23		Kayak	1	F
Lüchfeld	04.05.23	39	Camposan-Extra	0,2	W
Lüchfeld	04.05.23	39	ELATUS ERA	0,8	F
Beerfelde	08.10.22	10	Arnold	0,36	H
Beerfelde	27.10.22	13	Hinode	0,13	I
Beerfelde	22.05.23	55	Curbatur	0,29	F
Beerfelde	22.05.23	55	Azbany	0,5	F
Gadegast	05.10.22	11	Picona	3 l/ha	H
Gadegast	14.10.22	13	Karate Zeon	0,075 l/ha	I
Beetzendorf	17.10.22	12	BeFlex	0,3 l/ha	H
Beetzendorf	17.10.22	12	Herold SC	0,3 l/ha	H
Beetzendorf	17.10.22	12	Decis forte	0,075 l/ha	I
Beetzendorf	16.06.23	73	PRIMOR G	0,2 kg/ha	I
Baruth	12.10.22	12	Alliance	0,065	H
Baruth	12.10.22	12	Karate Zeon	0,075	I
Baruth	12.10.22	12	Cadou SC	0,24	H
Baruth	12.04.23	25	ARIANE C	1,5	H

**LSV Winterfuttergerste 2021 - 2023 D-Süd-Standorte  
PSM-Behandlung, faktoriell**

Ort	Datum	BBCH	Mittel	Menge	Wirkungsbereich	Stufe
Vipperow	12.05.23		Moddus	0,3 l/ha	W	mit Behandlung
Vipperow	15.05.23		Input Plus	1 l/ha	F	mit Behandlung
Sonnenwalde	19.04.23	31	Unix	0,5 l/ha	F	mit Fungizid/WR
Sonnenwalde	19.04.23	31	Moddus	0,5 l/ha	W	mit Fungizid/WR
Sonnenwalde	19.04.23	31	Caramba	1 l/ha	FW	mit Fungizid/WR
Sonnenwalde	03.05.23	39	Cerone	0,4 l/ha	W	mit Fungizid/WR
Sonnenwalde	09.05.23	51	Ascra Xpro	1,5 l/ha	F	mit Fungizid/WR
Kranepuhl	18.04.23	32	Moddus	0,5 l/ha	W	mit Fungizid/WR
Kranepuhl	08.05.23	51	ELATUS ERA	1 l/ha	F	mit Fungizid/WR
Gadegast	13.04.23	31		0,9 l/ha		mit Fungizid
Gadegast	18.04.23	34	Balaya	1,5 l/ha	F	mit Fungizid
Gadegast	03.05.23	43	Ascra Xpro	1,2 l/ha	F	mit Fungizid
Beetzendorf	06.04.23	31	Moddus	0,25 l/ha	W	ohne Fungizid
Beetzendorf	06.04.23	31	Moddus	0,5 l/ha	W	mit Fungizid
Beetzendorf	06.04.23	31	Input	1,25 l/ha	F	mit Fungizid
Beetzendorf	28.04.23	37	Cerone 660	0,2 l/ha	W	ohne Fungizid
Beetzendorf	28.04.23	37	Cerone 660	0,4 l/ha	W	mit Fungizid
Beetzendorf	08.05.23	49	Kayak	1,2 l/ha	F	mit Fungizid
Beetzendorf	08.05.23	49	Balaya	1,5 l/ha	F	mit Fungizid
Baruth	21.04.23	31	Input Classic	1 l/ha	F	mit Fungizid
Baruth	27.04.23	37		0,2 l/ha		ohne Fungizid
Baruth	27.04.23	37	Cerone 660	0,2 l/ha	W	ohne Fungizid
Baruth	27.04.23	37		0,4 l/ha		mit Fungizid
Baruth	27.04.23	37	Cerone 660	0,4 l/ha	W	mit Fungizid
Baruth	03.05.23	41	BAS 500 06 F	0,5 l/ha	FW	mit Fungizid
Baruth	03.05.23	41	Revytrex	1,5 l/ha	F	mit Fungizid

**Herausgeber:**

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden  
Telefon: + 49 351 2612-0  
Telefax: + 49 351 2612-1099  
E-Mail: [lfulg@smul.sachsen.de](mailto:lfulg@smul.sachsen.de)  
[www.smul.sachsen.de/lfulg](http://www.smul.sachsen.de/lfulg)

**Autoren:**

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Maik Panicke, Michael Sorms  
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen  
Waldheimer Str. 219  
01683 Nossen  
Telefon: +49 35242 631-7209  
Telefax: +49 35242 631-7299  
E-Mail: [Martin.Sacher@smul.sachsen.de](mailto:Martin.Sacher@smul.sachsen.de)

**Redaktion:**

siehe Autoren

**Redaktionsschluss:**

29.04.2024

**Verteilerhinweis**

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.