

LSV Wintertriticale 2024 Sachsen Verwitterungsstandorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

08.08.2024

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge			
			2022	2023	Versuchsjahr 2024	
			n = 3	n = 5	Christgrün	Forchheim
Stufe I	Lombardo (B)	k	92,2	91,9	90,1	81,2
	Presley (B)	k	87,1	88,6	95,8	76,7
	Belcanto (B)	k	87,6	91,4	100,8	84,2
	Rivolt (B)	k	90,8	90,3	102,3	68,1
	Charme (B)	k	88,8	89,4	92,5	72,9
	Trias	k		95,3	98,3	77,2
	Tributo	k		97,7	113,6	88,0
	Stelvio	k			101,2	81,4
	Fantastico	k			100,6	73,3
	Lumaco (B)	l	81,8	92,5	101,6	67,3
	Bicross	l			97,4	72,8
	Mittel				99,4	76,6
	Mittel (B)		88,0	90,7	97,2	75,1
	GD 5 %				6,4	6,5
	Stufe II	Lombardo (B)	k	93,5	100,7	102,1
Presley (B)		k	92,6	95,0	97,4	86,2
Belcanto (B)		k	90,8	95,8	109,1	97,8
Rivolt (B)		k	95,5	101,7	112,5	93,4
Charme (B)		k	90,4	95,6	101,7	84,8
Trias		k		102,2	112,6	101,9
Tributo		k		100,1	112,0	98,9
Stelvio		k			105,9	101,3
Fantastico		k			106,1	91,9
Lumaco (B)		l	88,6	98,2	110,1	89,1
Bicross		l			104,9	91,6
Mittel					106,7	93,8
Mittel (B)			91,9	97,9	105,5	91,1
GD 5 %					6,4	6,5

B = Sorten der Bezugsbasis

Typ: k = Sorte mit kurzem Stroh; l = Sorte mit längerem Stroh

LSV Wintertriticale 2024 Sachsen Verwitterungsstandorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge			
			2022	2023	Versuchsjahr 2024	
			n = 3	n = 5	Christgrün	Forchheim
Stufe I	Lombardo (B)	k	105	101	93	108
	Presley (B)	k	99	98	99	102
	Belcanto (B)	k	99	101	104	112
	Rivolt (B)	k	103	100	105	91
	Charme (B)	k	101	99	95	97
	Trias	k		105	101	103
	Tributo	k		108	117	117
	Stelvio	k			104	108
	Fantastico	k			103	98
	Lumaco (B)	l	93	102	105	90
	Bicross	l			100	97
	Mittel (B)		88,0	90,7	97,2	75,1
	GD 5 %				6,6	8,6
	Stufe II	Lombardo (B)	k	102	103	97
Presley (B)		k	101	97	92	95
Belcanto (B)		k	99	98	103	107
Rivolt (B)		k	104	104	107	103
Charme (B)		k	98	98	96	93
Trias		k		104	107	112
Tributo		k		102	106	109
Stelvio		k			100	111
Fantastico		k			101	101
Lumaco (B)		l	96	100	104	98
Bicross		l			99	101
Mittel (B)			91,9	97,9	105,5	91,1
GD 5 %					6,1	7,1

B = Sorten der Bezugsbasis

Typ: k = Sorte mit kurzem Stroh; l = Sorte mit längerem Stroh