

LSV Wintertriticale 2025 Sachsen Löß-Standorte

08.08.2025

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge			
			2023	2024	Versuchsjahr 2025	
			n = 4	n = 4	Pommritz	Nossen
Stufe I	Lombardo (B)	k	98,7	76,7	91,4	102,7
	Rivolt (B)	k	98,8	88,4	106,2	104,5
	Trias (B)	k	102,2	84,7	94,8	101,4
	Tributo (B)	k	101,8	91,0	102,8	102,0
	Fantastico	k		84,5	94,4	98,2
	Mittel				97,9	101,7
	Mittel (B)		100,4	85,2	98,8	102,6
	GD 5 %				4,7	4,3
Stufe II	Lombardo (B)	k	109,7	97,8	113,4	111,3
	Rivolt (B)	k	109,5	103,8	119,6	112,1
	Trias (B)	k	115,8	104,3	114,9	112,1
	Tributo (B)	k	108,4	101,0	112,2	103,2
	Fantastico	k		97,9	104,4	107,1
	Mittel				112,9	109,1
	Mittel (B)		110,8	101,7	115,0	109,7
	GD 5 %				4,7	4,3

B = Sorten der Bezugsbasis

Typ: k = Sorte mit kurzem Stroh

LSV Wintertriticale 2025 Sachsen Löß-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge			
			2023	2024	Versuchsjahr 2025	
			n = 4	n = 4	Pommritz	Nossen
Stufe I	Lombardo (B)	k	98	90	93	100
	Rivolt (B)	k	98	104	108	102
	Trias (B)	k	102	99	96	99
	Tributo (B)	k		107	104	99
	Fantastico	k		99	96	96
	Mittel (B)		100,4	85,2	98,8	102,6
	GD 5 %				4,8	4,2
Stufe II	Lombardo (B)	k	99	96	99	101
	Rivolt (B)	k	99	102	104	102
	Trias (B)	k	104	103	100	102
	Tributo (B)	k		99	98	94
	Fantastico	k		96	91	98
	Mittel (B)		110,8	101,7	115,0	109,7
	GD 5 %				4,1	3,9

B = Sorten der Bezugsbasis

Typ: k = Sorte mit kurzem Stroh