

LSV Wintertriticale 2026 Sachsen Verwitterungsstandorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

05.08.2026

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge				
			2024	2025		Versuchsjahr 2026	
			n = 4	n = 5		Christgrün	Forchheim
Stufe I	Lombardo (B)	k	81,2	85,4		104,9	59,7
	Rivolt (B)	k	84,1	84,9		104,0	45,6
	Trias (B)	k	87,5	84,5		97,6	51,0
	Tributo (B)	k	92,9	87,8		108,1	58,7
	Fantastico (B)	k	88,3	82,4		90,9	49,2
	RGT Zigzac	k				97,7	56,3
	Lumaco (B)	l	82,1	84,5		83,2	52,5
	Bicross (B)	l	81,9	83,4		100,0	52,7
	Trimobe	l				97,8	59,2
	Rugiro	l				104,2	57,6
	RGT Comebac	l				108,6	51,7
	Mittel					99,7	54,0
	Mittel (B)		85,4	84,7		98,4	52,8
	GD 5 %					8,2	6,3
Stufe II	Lombardo (B)	k	94,7	92,1		106,5	59,6
	Rivolt (B)	k	99,0	91,9		107,8	55,5
	Trias (B)	k	101,4	89,6		107,0	57,7
	Tributo (B)	k	98,5	91,9		112,4	60,0
	Fantastico (B)	k	96,4	88,8		104,3	56,1
	RGT Zigzac	k				103,3	60,9
	Lumaco (B)	l	96,0	88,6		102,2	56,8
	Bicross (B)	l	93,6	88,1		102,1	52,6
	Trimobe	l				101,9	56,2
	Rugiro	l				108,7	59,6
	RGT Comebac	l				108,8	55,1
	Mittel					105,9	57,3
	Mittel (B)		97,1	90,1		106,0	56,9
	GD 5 %					8,2	6,3

B = Sorten der Bezugsbasis

Typ: k = Sorte mit kurzem Stroh; l = Sorte mit längerem Stroh

LSV Wintertriticale 2026 Sachsen Verwitterungsstandorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge				
			2024	2025		Versuchsjahr 2026	
			n = 4	n = 5		Christgrün	Forchheim
Stufe I	Lombardo (B)	k	95	101		107	113
	Rivolt (B)	k	98	100		106	86
	Trias (B)	k	102	100		99	97
	Tributo (B)	k	109	104		110	111
	Fantastico (B)	k	103	97		92	93
	RGT Zigzac	k				99	107
	Lumaco (B)	l	96	100		85	99
	Bicross (B)	l	96	99		102	100
	Trimobe	l				99	112
	Rugiro	l				106	109
	RGT Comebac	l				110	98
	Mittel (B)		85,4	84,7		98,4	52,8
	GD 5 %					8,3	12,0
Stufe II	Lombardo (B)	k	98	102		100	105
	Rivolt (B)	k	102	102		102	98
	Trias (B)	k	104	99		101	101
	Tributo (B)	k	101	102		106	105
	Fantastico (B)	k	99	98		98	99
	RGT Zigzac	k				97	107
	Lumaco (B)	l	99	98		96	100
	Bicross (B)	l	96	98		96	92
	Trimobe	l				96	99
	Rugiro	l				103	105
	RGT Comebac	l				103	97
	Mittel (B)		97,1	90,1		106,0	56,9
	GD 5 %					7,7	11,1

B = Sorten der Bezugsbasis

Typ: k = Sorte mit kurzem Stroh; l = Sorte mit längerem Stroh